

Kombinatorische Optimierung 1 WS 2012/2013

6. Übungsblatt

44. (a) Verwenden Sie den *Edmonds Blossom Algorithmus* zur Bestimmung eines Matchings mit maximaler Kardinalität in dem Graphen in Abbildung 1. Geben Sie eine Teilmenge S der Knotenmenge an, die die Tutte-Berge-Formel erfüllt und begründen Sie ihre Antwort.
- (b) Geben Sie für den Graphen in Abbildung 1 die Edmonds-Gallai-Dekomposition an. Können Sie die Korrektheit dieser Dekomposition begründen?

45. Zeigen Sie mit Hilfe des Optimalitätskriteriums für Matchings mit maximaler Kardinalität (Satz von Berge), dass jeder einfache Graph mit n Knoten und minimalem Grad k ein Matching der Kardinalität $\min\{\frac{n}{2}, k\}$ besitzt.

46. Beweisen Sie, dass jeder 3-reguläre Graph mit höchstens 2 Brücken ein perfektes Matching besitzt. (Eine Brücke in einem Graphen G ist eine Kante $e \in E(G)$ mit der Eigenschaft, dass $G - e$ mehr Zusammenhangskomponenten als G hat.) Gibt es einen 3-regulären Graphen ohne ein perfektes Matching?

Hinweis: Verwenden Sie die Tutte-Berge-Formel bzw. eine Charakterisierung von perfekten Graphen, die unmittelbar aus dieser Formel folgt.

47. Sei G ein k -fach zusammenhängender Graph, d.h. G hat mehr als k Knoten und besitzt die Eigenschaft, dass er nach dem Entfernen von $k - 1$ beliebigen Knoten immer noch zusammenhängend ist. Es sei $\nu(G) := \max\{|M| : M \text{ ist ein Matching in } G\}$ und $\tau(G)$ die minimale Kardinalität einer Knotenberdeckung in G , d.h. $\tau(G) = \min\{|A| : A \subseteq V(G) \text{ und } \forall e \in E(G) A \cap e \neq \emptyset\}$. Es gelte $2\nu(G) < |V(G)| - 1$. Beweisen Sie

- (a) $\nu(G) \geq k$,
- (b) $\tau(G) \leq 2\nu(G) - k$.

Hinweis: Verwenden Sie den Satz über die Edmonds-Gallai-Dekomposition.

48. (Die Ungarische Methode.)

Sei $G = (A \dot{\cup} B, E)$ ein vollständiger bipartiter Graph mit $|A| = |B|$ und $c_{ij} \in \mathbb{R}_+$ das Gewicht der Kante $\{i, j\}$ für $i \in A$ und $j \in B$. Das Gewicht eines perfekten Matchings M in G ist als $c(M) := \sum_{\{i,j\} \in M} c_{ij}$ definiert. Es soll ein perfektes Matching M^* in G mit minimalem Gewicht bestimmt werden, d.h. $c(M^*) = \min\{c(M) : M \text{ ist ein perfektes Matching in } G\}$. Eine Abbildung $y: A \dot{\cup} B \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Potential falls $y_i + y_j \leq c_{ij}, \forall i \in A, \forall j \in B$. Die Summe $v(y) := \sum_{i \in A \dot{\cup} B} y(i)$ heißt Wert des Potentials.

- (a) Zeigen Sie, dass $c(M) \leq v(y)$ gilt für jedes perfekte Matching M und jedes Potential y .
- (b) Eine Kante $e = \{i, j\} \in E(G)$ heißt *straff* bzgl. einem Potential y falls $y(i) + y(j) = c_{ij}$. Wir bezeichnen mit G_y jenen Teilgraphen von G , der aus den straffen Kanten bzgl. y besteht. Die Ungarische Methode startet mit einem leeren Matching und einem Potential $y(i) = 0, \forall i \in V(G)$, und modifiziert iterativ das Matching und das Potential, sodass das Matching stets aus straffen Kanten besteht. Der Algorithmus terminiert, wenn das aktuelle Matching perfekt ist. Während des Verfahrens wird der Graph G_y so orientiert, dass alle Matching-Kanten von A nach B und alle anderen Kanten in $E(G_y)$ von B nach A verlaufen.

Der allgemeine Iterationsschritt sieht folgendermaßen aus. Seien R_A bzw. R_B die Mengen der durch M ungematchten Knoten in A bzw. B . Sei Z_y die Menge der Knoten von G , die ausgehend von Knoten aus R_A entlang von gerichteten Pfaden in G_y erreichbar sind. Falls $R_B \cap Z_y \neq \emptyset$, dann liegt ein M -augmentierender Weg in G_y vor; das Matching wird augmentiert. Sei M nun das augmentierte Matching. Falls $R_B \cap Z_y = \emptyset$, dann setze $\Delta := \min\{c(\{i, j\}) - y(i) - y(j) : i \in Z_y \cap A, j \in B \setminus Z_y\} > 0$. Setze $y'(i) := y(i) + \Delta, \forall i \in Z_y \cap A$, und $y'(i) := y(i) - \Delta, \forall i \in Z_y \cap B$. Es ist leicht zu zeigen, dass y' ein Potential ist und der Graph $G_{y'}$ das Matching M beinhaltet.

Alle Kanten in $E(G_{y'}) \setminus E(G_y)$ werden von A nach B orientiert. Sei $Z_{y'}$ die Menge der Knoten in $G_{y'}$, die von R_A aus entlang gerichteten Pfaden erreichbar sind. Es kann gezeigt werden, dass $Z_y \subset Z_{y'}$ und $Z_y \neq Z_{y'}$ gelten. Ersetze y durch y' und Z_y durch $Z_{y'}$.

Der allgemeine Iterationsschritt wird mit dem aktuellen Matching M und dem aktuellen Potential y wiederholt, bis M ein perfektes Matching ist.

Zeigen Sie: Bei Terminierung des Algorithmus ist M das gesuchte perfekte Matching mit minimalem Gewicht.

- (c) Wenden Sie die Ungarische Methode an, um ein perfektes Matching mit minimalem Gewicht in einem vollständigen bipartiten Graphen mit 5 Knoten in jeder Seite der Partition und folgenden Kantengewichten $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ zu bestimmen:

$$C = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 7 & 15 & 4 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 9 & 6 & 12 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 14 & 6 & 10 \\ 9 & 6 & 12 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

- (d) Analysieren Sie die Zeitkomplexität der Ungarischen Methode aus (b).




Abbildung 1: Graph für Aufgabe 44.